

Dr. Luis Javier Cardenas Herrera

Cirujano Gastrointestinal Laparoscopista y de Obesidad

Dra. Hebe A. Avilés V.

Cirujana General Laparoscopista y de Obesidad

Indicaciones Pre operatorias

Apendicectomía Abierta o Laparoscópica

Indicación Principal de Cirugía Se ha decidido la realización de una Apendicectomía Abierta o Laparoscópica que es la extirpación del Apéndice Cecal, ya que, sus exámenes de laboratorio y de imágenes han revelado que usted posee una alteración en éste órgano, produciéndole inflamación en forma aguda que de no tratarse pudiese tener complicaciones mayores generalmente es un diagnóstico y procedimiento de urgencia que no da oportunidad de revisar estos documentos. Por lo cual requerimos que llene el formulario de Consentimiento Operatorio que puede encontrar en esta Web (www.cirugia-laparoscopia-panama.com), seguir las indicaciones pre operatorias que le damos y ante cualquier duda notificarnos.

- Ayuno aproximadamente 8 horas antes de la cirugía, si la cirugía es en horas de la mañana no tomar ni agua después de las 11:00 PM. Si la cirugía es en horas de la tarde tomar un desayuno ligero sin abundantes grasas y que sea 8 horas antes de la cirugía.
- Si usted toma medicamentos para la presión alta, puede y debe tomarlos con 30 cc de agua (1/4 de vaso de agua) al despertar en la mañana.
- Si usted toma medicamentos para la diabetes (azúcar en sangre) no los tome el día de la cirugía, pero avise a su médico.
- Si usted toma antiinflamatorios como (aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, alka-selzer) deben ser suspendidos 15 días antes de la cirugía. Los anti-inflamatorios inhiben el proceso de coagulación por lo que debe notificar a su medico si aún los está tomando. Si usted ingiere jengibre, te verde, Giessen, debe suspenderlos igualmente 15 días antes de la cirugía y avisar a su medico, ya que estas sustancias también influyen en la coagulación. Sin embargo por ser una cirugía de urgencia notifique a su medico para tomar las medidas pertinentes, como la de tener disponibles concentrados plaquetarios en caso necesario.
- No rasurar el área que se va a operar (se han demostrado menos infecciones del área quirúrgica con esta técnica).
- Debe llevar ropa cómoda y que no apriete.
- Debe acudir con un familiar o amigo de confianza a la cirugía.
- Debe admitirse al hospital una y media (1 1/2) hora antes de la hora programada para cirugía, entregar toda la documentación en admisión así como los exámenes de laboratorios, debe entregar la pre autorización de cirugía por su aseguradora si tiene seguro médico.
- En caso de sentirse resfriado(a) desde el día anterior a su cirugía favor notificar a su medico para decidir si se puede realizar la cirugía. En esta patología sólo notifique a su medico ya que por ser una cirugía de urgencia de practicarse la misma tomando las medidas necesarias para cada caso.